


～花の開花日地域差調査～

各地の花の開花日調査のご協力をお願いします。

同じ種類の花の種子を同じ日に一斉に播種し、開花日の地域による差の調査を計画しています。この調査にご協力して頂ける団体、施設を募集しています。写真を送ってもらい、各地の生育状況の差を確認します。

データは、地域によって花を選ぶ際の目安となるクライメートゾーンマップ（最低気温による区域区分地図）確認の為に活用させていただきます。ご協力いただいた皆様には、データ整理後に報告書をお渡しします。

クライメートゾーンマップ



- ◆ 使用する種子、基肥は提供させていただきますが、それ以外の水道代・薬剤等のご負担をお願いします。
- ◆ 応募団体、施設の数が10カ所未満の場合には中止となる場合があります。
- ◆ 応募多数の場合には地区毎の抽選となります。ご了承ください。
- ◆ 使用する種子等は変更となる場合があります。
- ◆ ご提供いただいたデータは当部会の帰属となります。

ご参加いただける団体・施設はメール又はFAXにて別紙の応募用紙に記入のうえ、下記までご連絡ください。（締切日 平成26年5月7日）

公益財団法人 都市緑化機構

グランドカバー・ガーデニング共同研究会 ガーデニング部会

連絡担当 小松（公益財団法人 都市緑化機構）

TEL 03-5216-7191 FAX 03-5216-7195

E-mail: komatsu@urbangreen.or.jp


花の開花日地域差調査

作業内容

必要面積 9㎡（基本面積1㎡×9アイテム）
 日長により開花時期が影響を受けるので夜間照明のない場所を選定してください。

予定栽培期間 平成26年6月～平成27年8月

アイテム別作業

植 物 名		ヒマワリ			コスモス			花 菜		シャーレポピー
品 種 名		ロシア	サンスポット	ピンセントオレンジ	秋咲き	センセーション	キャンパスイエロー	早陽一号	金 木	
花 芽 分 化		短 日	短 日	中 日	短日要求中	短日求小	短日要求大	低温要求小	低温要求	低温要求大
開花時の写真										
発芽時の写真										
事前準備		伐根除草後に深さ25cm程度まで十分に耕運して整地してください。								
基 肥		マグアンプ100g/㎡を施してよく混和してください。								
追 肥		不要です。基肥のみで栽培してください。								
薬 剤		無農薬で栽培を基本としてください。(病虫害の被害がひどい場合は適正な薬剤を使用し、薬剤名を記録してご連絡ください)								
除 草		発芽時の写真を参考に雑草はこまめに取り除いてください。								
播種予定日	暖地	平成26年6月15日			平成26年6月15日			平成26年9月15日		平成27年3月30日
	寒冷地	平成26年6月15日			平成26年6月15日			平成27年5月11日		平成27年4月15日
播種間隔		30cm間隔に1粒			20cm間隔に2粒			15cm間隔に2粒		10cm間隔に3粒
覆 土		10mm程度			2mm程度			2mm程度		2mm程度
灌 水		高温時を避けて、発芽までは2日に1回程度の灌水。発芽確認後は2週間無降雨の場合に灌水する。(土壌の状態により異なるので、しおれが見られた場合は間隔によらず灌水を行う)								
撮影方法		デジタルカメラで撮影してください。データはJPEGとし、データサイズは600KB程度でお願いします。								
撮影間隔	暖地	播種後5週間までは2週間間隔で以後は1週間間隔で開花終了まで			播種後5週間までは2週間間隔で以後は1週間間隔で開花終了まで			播種後から2週間間隔で開花終了まで	2月までは1ヶ月間隔。3月から2週間間隔	播種後5週間までは2週間間隔で以後は1週間間隔で開花終了まで
	寒冷地							播種後5週間までは2週間間隔で以後は1週間間隔で開花終了まで		
撮影データの提出方法		指定の書式(エクセル)に写真データを貼りつけ、指定のアドレスにメールに添付して送信してください。送信先のアドレスは後日連絡します。								
注意事項		発芽確認までは鳥の食害に注意してください。			開花に日長影響が大きいので夜間照明は厳禁です。			高温期は虫の食害に注意。		アブラムシの発生に注意